

**PLANTES DES ARCHIPELS  
HUON ET CHESTERFIELD**

Par A. GUILLAUMIN et J. M. VEILLON

L'archipel Huon situé au N.-O. de la Nouvelle-Calédonie comprend les îles Huon, Surprise, Fabre (sur laquelle se sont perdus le *Plato* en 1873 et le *Maitland* en 1874) et Leleizour. Le *Curieux*, commandé par de CHAMBEYRON, en 1876, et par LAGUERRE, en 1877, avait abordé à l'île Surprise en 1876 et les quelques échantillons récoltés avaient été soumis au P. MONTROUZIER qui avait noté que l'île était aux deux tiers boisée. A. V. DÄNIKER visita l'île en mai 1925 mais n'a pas donné la liste de ses récoltes conservées à l'Herbier de Zurich : J. P. BLANCHON y retourna en septembre 1965 ; ses récoltes, déterminées par J. M. VEILLON, sont conservées à Nouméa, à l'O.R.S.T.O.M., (ex I.F.O.) où H. S. MACKEE a relevé la liste ci-après.

*Dans la zone littorale :*

*Lepturus repens* R. Br.  
*Thuarea involuta* R. Br.  
*Achyranthes aspera* L.  
*Stenotaphrum subulatum* Trin.  
*Sesuvium portulacastrum* L.  
*Vigna lutea* A. Gray (= *V. marina* Merr.)  
*Tribulus cistoides* L.  
*Suriana maritima* L.  
*Euphorbia eremophila* A. Cunn.  
*Triumfetta procumbens* Forst.  
*Scaevola frutescens* Krause  
*Wedelia uniflora* W. Gl.

*Vers l'intérieur :*

*Cenchrus calyculatus* Cav.  
*C. echinatus* L.  
*Mariscus pennatus* Domin  
*Cocos nucifera* L.  
*Amaranthus gracilis* L.  
*Pisonia grandis* R. Br.  
*Boerhaavia repens* L.  
*Cassytha filiformis* L.  
*Leucoena glauca* Benth. (= *L. leucocephala* de Wit.)  
*Abutilon indicum* Sweet  
*Hibiscus tiliaceus* L.  
*Lantana camara* L.  
*Stachytarpheta indica* Vahl

*Operculina turpethum* Mans.  
*Solanum nigrum* L.  
*Bidens pilosa* L.

MONTROUZIER avait indiqué à l'île Surprise la présence de :

*Cenchrus calyculatus* Cav.  
*Achyranthes* non nommé (probablement *A. aspera* L.)  
*Portulaca* sp.  
*Abrus precatorius* L.  
*Desmodium* sp.  
*Tribulus cistoides* L.  
*Euphorbia* sp.  
*Colubrina asiatica* Brong.  
*Abutilon indicum* L.  
*Hibiscus* sp.  
*Terminalia* sp.  
*Ochrosia* sp.  
*Plumbago zeylanica*  
*Calystegia* ? (sans doute *Operculina turpethum* Mans.)  
*Tournefortia argentea* L.  
*Morinda citrifolia* L.  
*Cucumis citrullus* Ser. in DC.

Il signalait en outre :

*Timeroyea* ? *artensis* Montr. ? (= *Calpidia artensis* Heimerl).

Cette espèce n'est connue qu'en Nouvelle-Calédonie ; ne s'agirait-il pas plutôt du *Pisonia grandis* R. Br. (= *Ceodes Brunoniana* Skotts.) que DÄNIKER a récolté à l'île Surprise en 1925 et BLANCHON en 1965.

Aucune plante n'avait été signalée aux Iles Chesterfield situées à mi-chemin entre la Nouvelle-Calédonie et le Queensland. FERRÉ vient de s'y rendre en novembre 1968 et en a rapporté quelques échantillons d'herbier actuellement conservés à Nouméa à l'O.R.S.T.O.M., où J. M. VELLON les a déterminées et dont H. S. MACKEE a relevé la liste ci-après :

*Lepturus repens* R. Br.  
*Thuarea involuta* R. Br.  
*Stenotaphrum subulatum* Trin.  
*Achyranthes aspera* L.  
*Boerhaavia repens* L.  
*Sesuvium portulacastrum* L.  
*Tribulus cistoides* L.  
*Euphorbia eremophila* A. Cunn.  
*Abutilon indicum* Sweet.  
*Tournefortia argentea* L.